TEMA 1

1. Dado $\vec{f}(x, y, z) = (xy, zx, 2yz)$, calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie abierta Σ de ecuación $z = 9 - x^2$ con $z \geq y$, $y \geq 0$, $x \geq 0$, orientada hacia z^+ .

En el esquema se observa Σ rayada en color azul y su proyección D_{xy} rayada en rojo sobre el plano xy . La curva C es:

$$C = \begin{cases} z = 9 - x^2 \\ z = y \end{cases} \equiv \begin{cases} y = 9 - x^2 \\ z = y \end{cases}$$

Con lo cual $D_{xy} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \leq 9 - x^2 \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$.

Con esto Σ admite la parametrización $\vec{X} = \underbrace{(x, y, 9 - x^2)}_{\vec{F}(x,y)}$ con $(x, y) \in D_{xy}$, siendo

$$(\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y)(x, y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2x \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (2x, 0, 1) \text{ que tiene la orientación pedida (hacia } z^+ \text{)}. \text{ Entonces:}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma &= \iint_{D_{xy}} \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \frac{\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y}{\|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\|} \|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\| \, dx \, dy = \\ &= \iint_{D_{xy}} (xy, 9x - x^3, 18y - 2x^2y) \cdot (2x, 0, 1) \, dx \, dy = \int_0^3 dx \int_0^{9-x^2} 18y \, dy = \\ &= 9 \int_0^3 (9 - x^2)^2 dx = 9[81x - 6x^3 + x^5/5]_0^3 = 5832/5 \end{aligned}$$

Respuesta: $\boxed{\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = 5832/5}$.

2. Dado $\vec{f}(x, y) = (\frac{-4y}{x^2+y^2}, \frac{4x}{x^2+y^2})$ definido en $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$, analice si $\vec{f}$ admite función potencial en dicho dominio.

La matriz jacobiana $D\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{8xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{4y^2-4x^2}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{4y^2-4x^2}{(x^2+y^2)^2} & \frac{-8xy}{(x^2+y^2)^2} \end{pmatrix}$ resulta continua y simétrica en $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$.

Como $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$ no es simplemente conexo, debemos calcular la integral de línea de $\vec{f}$ alrededor de cualquier curva cerrada que rodee al origen de coordenadas. En este caso conviene utilizar una circunferencia del tipo $x^2 + y^2 = 1$ pues facilitará los cálculos al evaluar el campo en puntos de la misma.

Si para esta curva C adoptamos la ecuación $\vec{X} = \underbrace{(\cos(u), \sen(u))}_{\vec{g}(u)}$ con $0 \leq u \leq 2\pi$, se tiene que:

$$\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi} \vec{f}(\vec{g}(u)) \cdot \vec{g}'(u) \, du = \int_0^{2\pi} \underbrace{(-4\sen(u), 4\cos(u)) \cdot (-\sen(u), \cos(u))}_{=4} \, du = 4 \int_0^{2\pi} du = 8\pi$$

Como $\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} \neq 0$, no existe función potencial.

Respuesta: $\boxed{\vec{f} \text{ no admite función potencial en } \mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}}$.

3. **Demuestre** que $f(x, y) = e^{x^2+y^2+2x+5}$ produce un mínimo local en un punto (x_0, y_0) y **calcule** el volumen del cuerpo H definido por $0 \leq z \leq f(x, y)$ con $(x, y) \in D_{xy}$, donde D_{xy} es un círculo de radio $R = 1$ con centro en el mencionado punto (x_0, y_0) .

Dado que f es la composición de un polinomio con una exponencial, $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, entonces podemos analizar extremos locales en puntos estacionarios mediante el hessiano.

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= (2x+2) e^{x^2+y^2+2x+5} \\ f'_y(x, y) &= 2y e^{x^2+y^2+2x+5} \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} (2x+2) e^{x^2+y^2+2x+5} = 0 \\ 2y e^{x^2+y^2+2x+5} = 0 \end{cases} \rightarrow (x_0, y_0) = (-1, 0).$$

$$\begin{aligned} f''_{xx}(x, y) &= [2 + (2x+2)^2] e^{x^2+y^2+2x+5} \\ f''_{xy}(x, y) &= 2y(2x+2) e^{x^2+y^2+2x+5} \\ f''_{yy}(x, y) &= (2+4y^2) e^{x^2+y^2+2x+5} \end{aligned} \rightarrow H(-1, 0) = \begin{vmatrix} f''_{xx}(-1, 0) & f''_{xy}(-1, 0) \\ f''_{xy}(-1, 0) & f''_{yy}(-1, 0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2e^4 & 0 \\ 0 & 2e^4 \end{vmatrix} = 4e^8 > 0$$

Dado que $H(-1, 0) > 0$ y $f''_{xx}(-1, 0) = 2e^4 > 0$, queda demostrado que $f(-1, 0) = e^4$ es mínimo local. Acorde al enunciado el cuerpo está apoyado en el plano xy ($z = 0$), el "techo" es $f(x, y) > 0$ y la base D_{xy} es el círculo de radio 1 con centro en $(x_0, y_0) = (-1, 0)$, es decir, $(x+1)^2 + y^2 \leq 1$.

$$\text{Luego } \text{Vol}(H) = \iiint_H dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{f(x,y)} dz = \iint_{D_{xy}} e^{x^2+y^2+2x+5} dx dy.$$

Aplicando el cambio de variables $\begin{cases} x = -1 + r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$ con $|J(r, \theta)| = r$, queda:

$$\text{Vol}(H) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \underbrace{e^{r^2+4}}_{[e^{r^2+4}/2]_0^1} r dr = \frac{e^5 - e^4}{2} \int_0^{2\pi} d\theta = \pi(e^5 - e^4). \quad \text{Respuesta: } \boxed{\text{Vol}(H) = \pi(e^5 - e^4)}.$$

4. Sea la curva Ω definida por la intersección de $y + z = 2$ con $4x^2 + y^2 = 4$, orientada de manera que su versor tangente en $(1, 0, 2)$ tiene componente en $\tilde{k}$ negativa. **Calcule** la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de Ω sabiendo que $\vec{f}(x, y, z) = (z^2, \varphi(z), y^2)$ con φ' continua en $\mathbb{R}$.

En el gráfico de la derecha se observa que Ω es cerrada. Dado que $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ pues φ' es continua en $\mathbb{R}$ y las otras dos componentes son polinómicas podemos aplicar el teorema del rotor.

Vamos a usar como superficie el trozo de plano Σ de ecuación $y + z = 2$ con $4x^2 + y^2 \leq 4$ orientado con $\tilde{n}$ según se indica en la figura, en correspondencia con la orientación dada para Ω .

$$\nabla \times \vec{f}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \tilde{i} & \tilde{j} & \tilde{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ z^2 & \varphi(z) & y^2 \end{vmatrix} = (2y - \varphi'(z), 2z, 0)$$

Ecuación de Σ : $\vec{X} = \underbrace{(x, y, 2-y)}_{\vec{F}(x,y)}$ con $(x, y) \in D_{xy}$ definido por $4x^2 + y^2 \leq 4$.

$$\text{Normal a } \Sigma: \vec{n} = F'_x(x, y) \times F'_y(x, y) = \begin{vmatrix} \tilde{i} & \tilde{j} & \tilde{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (0, 1, 1) \text{ correctamente orientada según gráfico.}$$

$$\oint_{\Omega^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_{\Sigma} \nabla \times \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iint_{D_{xy}} \nabla \times \vec{f}(x, y, 2-y) \cdot \frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|} \|(0,1,1)\| dx dy = \iint_{D_{xy}} (4-2y) dx dy$$

Aplicando el cambio de variables definido por $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = 2r \sin(\theta) \end{cases}$ con $|J(r, \theta)| = 2r$, se tiene:

$$\oint_{\Omega^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \underbrace{[4 - 4r \sin(\theta)] 2r}_{[4r^2 - \frac{8}{3} \sin(\theta)r^3]_0^1} dr = \int_0^{2\pi} [4 - \frac{8}{3} \sin(\theta)] d\theta = [4\theta + \frac{8}{3} \cos(\theta)]_0^{2\pi} = 8\pi$$

Respuesta: $\boxed{\oint_{\Omega^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 8\pi}$.

5. Dado $\vec{f}(x, y, z) = (2 + xg(x), 3 + yg(x), 4 - 3zg(x))$ con $\vec{f}(1,0,0) = (2,3,4)$ y $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, halle una $g(x)$ de manera que el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie frontera ∂H del cubo H definido por $[-a, a] \times [-a, a] \times [-a, a]$ con $a > 0$ resulte entrante y con módulo igual al doble del volumen de H .

Dado que $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ podemos aplicar el teorema de la divergencia, en el cual se supone que ∂H está orientado hacia afuera de H . Por ello, para que el flujo resulte entrante debe ser negativo, es decir:

$$\iint_{\partial H} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iiint_H \nabla \cdot \vec{f} dx dy dz \quad \text{donde } \nabla \cdot \vec{f}(x, y, z) = g(x) + xg'(x) + g(x) - 3g(x) = xg'(x) - g(x)$$

Si por ejemplo imponemos que $\nabla \cdot \vec{f}(x, y, z) = -2$ constante, tendremos que:

$$\iint_{\partial H} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iiint_H \underbrace{\nabla \cdot \vec{f}}_{-2} dx dy dz = -2 \iiint_H dx dy dz = -2 \text{ vol}(H), \text{ que es lo que se pide.}$$

Entonces, una solución es hallar $g(x)$ tal que $xg'(x) - g(x) = -2$ con $g(1) = 0$ que surge de imponer que $\vec{f}(1,0,0) = (2,3,4)$. Luego:

$$\begin{aligned} xg'(x) = g(x) - 2 &\rightarrow \frac{dg(x)}{g(x)-2} = \frac{dx}{x} \xrightarrow{\text{integrando}} \ln |g(x) + 2| = \ln |x| + A \\ \rightarrow |g(x) - 2| &= e^A \underbrace{e^{\frac{\ln|x|}{|x|}}}_{|x|} \rightarrow g(x) - 2 = \underbrace{\pm e^A}_C x. \end{aligned}$$

Con lo cual todas las posibles expresiones (solución general) que se obtienen son $g(x) = 2 + Cx$ (donde se sostiene el caso $C=0$ pues $g(x) = 2$ es solución de la ecuación diferencial), imponiendo ahora que $g(1) = 0$ es necesario que $C = -2$.

Respuesta: $\boxed{g(x) = 2 - 2x}$.

TEMA 2

1. Dado $\vec{f}(x, y, z) = (xz, xy, 2xz)$, **calcule** el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie abierta Σ de ecuación $z = 9 - y^2$ con $z \geq x$, $y \geq 0$, $x \geq 0$, orientada hacia z^+ .

En el esquema se observa Σ rayada en color azul y su proyección D_{xy} rayada en rojo sobre el plano xy . La curva C es:

$$C = \begin{cases} z = 9 - y^2 \\ z = x \end{cases} \equiv \begin{cases} x = 9 - y^2 \\ z = x \end{cases}$$

Con lo cual $D_{xy} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \leq 9 - y^2 \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$

Con esto Σ admite la parametrización $\vec{X} = \underbrace{(x, y, 9 - y^2)}_{\vec{F}(x,y)}$ con $(x, y) \in D_{xy}$, siendo

$$(\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y)(x, y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2y \end{vmatrix} = (0, 2y, 1) \text{ que tiene la orientación pedida (hacia } z^+ \text{). Entonces:}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma &= \iint_{D_{xy}} \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \frac{\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y}{\|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\|} \|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\| \, dx \, dy = \\ &= \iint_{D_{xy}} \underbrace{(x(9 - y^2), xy, 18x - 2xy^2)}_{2xy^2 + 18x - 2x^2y = 18x} \cdot (0, 2y, 1) \, dx \, dy = \int_0^3 dy \int_0^{9-y^2} 18x \, dx = \\ &= 9 \int_0^3 (9 - y^2)^2 \, dy = 9[81y - 6y^3 + y^5/5]_0^3 = 5832/5 \end{aligned}$$

Respuesta: $\boxed{\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = 5832/5}$.

2. Dado $\vec{f}(x, y) = (\frac{-2y}{x^2+y^2}, \frac{2x}{x^2+y^2})$ definido en $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$, **analice** si $\vec{f}$ admite función potencial en dicho dominio.

La matriz jacobiana $D\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{4xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} & \frac{-4xy}{(x^2+y^2)^2} \end{pmatrix}$ resulta continua y simétrica en $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$.

Como $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$ no es simplemente conexo, debemos calcular la integral de línea de $\vec{f}$ alrededor de cualquier curva cerrada que rodee al origen de coordenadas. En este caso conviene utilizar una circunferencia del tipo $x^2 + y^2 = 1$ pues facilitará los cálculos al evaluar el campo en puntos de la misma.

Si para esta curva C adoptamos la ecuación $\vec{X} = \underbrace{(\cos(u), \text{sen}(u))}_{\vec{g}(u)}$ con $0 \leq u \leq 2\pi$, se tiene que:

$$\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi} \vec{f}(\vec{g}(u)) \cdot \vec{g}'(u) \, du = \int_0^{2\pi} \underbrace{(-2\text{sen}(u), 2\cos(u)) \cdot (-\text{sen}(u), \cos(u))}_{=2} \, du = 2 \int_0^{2\pi} du = 4\pi$$

Como $\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} \neq 0$, no existe función potencial.

Respuesta: $\boxed{\vec{f} \text{ no admite función potencial en } \mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}}$.

3. **Demuestre** que $f(x, y) = e^{x^2+y^2+2y+5}$ produce un mínimo local en un punto (x_0, y_0) y **calcule** el volumen del cuerpo H definido por $0 \leq z \leq f(x, y)$ con $(x, y) \in D_{xy}$, donde D_{xy} es un círculo de radio $R = 1$ con centro en el mencionado punto (x_0, y_0) .

Dado que f es la composición de un polinomio con una exponencial, $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, entonces podemos analizar extremos locales en puntos estacionarios mediante el hessiano.

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= 2x e^{x^2+y^2+2y+5} \\ f'_y(x, y) &= (2y+2)e^{x^2+y^2+2y+5} \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} 2x e^{x^2+y^2+2y+5} = 0 \\ (2y+2) e^{x^2+y^2+2y+5} = 0 \end{cases} \rightarrow (x_0, y_0) = (0, -1).$$

$$\begin{aligned} f''_{xx}(x, y) &= (2+4x^2) e^{x^2+y^2+2y+5} \\ f''_{xy}(x, y) &= 2x(2y+2)e^{x^2+y^2+2y+5} \\ f''_{yy}(x, y) &= [2+(2y+2)^2] e^{x^2+y^2+2y+5} \end{aligned} \rightarrow H(0, -1) = \begin{vmatrix} f''_{xx}(0, -1) & f''_{xy}(0, -1) \\ f''_{xy}(0, -1) & f''_{yy}(0, -1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2e^4 & 0 \\ 0 & 2e^4 \end{vmatrix} = 4e^8 > 0$$

Dado que $H(0, -1) > 0$ y $f''_{xx}(0, -1) = 2e^4 > 0$, queda demostrado que $f(0, -1) = e^4$ es mínimo local. Acorde al enunciado el cuerpo está apoyado en el plano xy ($z = 0$), el “techo” es $f(x, y) > 0$ y la base D_{xy} es el círculo de radio 1 con centro en $(x_0, y_0) = (0, -1)$, es decir, $x^2 + (y+1)^2 \leq 1$.

$$\text{Luego } \text{Vol}(H) = \iiint_H dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{f(x,y)} dz = \iint_{D_{xy}} e^{x^2+y^2+2y+5} dx dy.$$

Aplicando el cambio de variables $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = -1 + r \sin(\theta) \end{cases}$ con $|J(r, \theta)| = r$, queda:

$$\text{Vol}(H) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \underbrace{e^{r^2+4}}_{[e^{r^2+4}/2]_0^1} r dr = \frac{e^5 - e^4}{2} \int_0^{2\pi} d\theta = \pi(e^5 - e^4). \quad \text{Respuesta: } \boxed{\text{Vol}(H) = \pi(e^5 - e^4)}.$$

4. Sea la curva Ω definida por la intersección de $x+z=2$ con $x^2+4y^2=4$, orientada de manera que su versor tangente en $(0,1,2)$ tiene componente en $\vec{k}$ positiva. **Calcule** la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de Ω sabiendo que $\vec{f}(x, y, z) = (\varphi(z), z^2, x^2)$ con φ' continua en $\mathbb{R}$.

En el gráfico de la derecha se observa que Ω es cerrada. Dado que $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ pues φ' es continua en $\mathbb{R}$ y las otras dos componentes son polinómicas podemos aplicar el teorema del rotor.

Vamos a usar como superficie el trozo de plano Σ de ecuación $x+z=2$ con $x^2+4y^2 \leq 4$ orientado con $\vec{n}$ según se indica en la figura, en correspondencia con la orientación dada para Ω .

$$\nabla \times \vec{f}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ \varphi(z) & z^2 & x^2 \end{vmatrix} = (-2z, \varphi'(z) - 2x, 0)$$

Ecuación de Σ : $\vec{X} = \underbrace{(x, y, 2-x)}_{\vec{F}(x,y)}$ con $(x, y) \in D_{xy}$ definido por $x^2+4y^2 \leq 4$.

$$\text{Normal a } \Sigma: \vec{n} = F'_x(x, y) \times F'_y(x, y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (1, 0, 1) \text{ correctamente orientada según gráfico.}$$

$$\oint_{\Omega^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_{\Sigma} \nabla \times \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iint_{D_{xy}} \nabla \times \vec{f}(x, y, 2-x) \cdot \frac{(1,0,1)}{\|(1,0,1)\|} \|(1,0,1)\| dx dy = \iint_{D_{xy}} (2x-4) dx dy$$

Aplicando el cambio de variables definido por $\begin{cases} x = 2r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$ con $|J(r, \theta)| = 2r$, se tiene:

$$\oint_{\Omega^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \underbrace{[4r \cos(\theta) - 4] 2r}_{\left[\frac{8}{3} \cos(\theta) r^3 - 4r^2\right]_0^1} dr = \int_0^{2\pi} \left[\frac{8}{3} \cos(\theta) - 4\right] d\theta = \left[\frac{8}{3} \sin(\theta) - 4\theta\right]_0^{2\pi} = -8\pi$$

Respuesta: $\boxed{\oint_{\Omega^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = -8\pi}$.

5. Dado $\vec{f}(x, y, z) = (7 + xg(x), 2 - 4yg(x), 4 + zg(x))$ con $\vec{f}(1,0,0) = (7, 2, 4)$ y $\vec{f} \in C^1(\mathcal{R}^3)$, halle una $g(x)$ de manera que el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie frontera ∂H del cubo H definido por $[-b, b] \times [-b, b] \times [-b, b]$ con $b > 0$ resulte entrante y con módulo igual al doble del volumen de H .

Dado que $\vec{f} \in C^1(\mathcal{R}^3)$ podemos aplicar el teorema de la divergencia, en el cual se supone que ∂H está orientado hacia afuera de H . Por ello, para que el flujo resulte entrante debe ser negativo, es decir:

$$\oiint_{\partial H} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iiint_H \nabla \cdot \vec{f} dx dy dz \text{ donde}$$

$$\nabla \cdot \vec{f}(x, y, z) = g(x) + xg'(x) - 4g(x) + g(x) = xg'(x) - 2g(x)$$

Si por ejemplo imponemos que $\nabla \cdot \vec{f}(x, y, z) = -2$ constante, tendremos que:

$$\oiint_{\partial H} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iiint_H \underbrace{\nabla \cdot \vec{f}}_{-2} dx dy dz = -2 \iiint_H dx dy dz = -2 \text{ vol}(H), \text{ que es lo que se pide.}$$

Entonces, una solución es hallar $g(x)$ tal que $xg'(x) - 2g(x) = -2$ con $g(1) = 0$ que surge de imponer que $\vec{f}(1,0,0) = (7, 2, 4)$. Luego:

$$xg'(x) = 2g(x) - 2 \rightarrow \frac{dg(x)}{g(x)-1} = 2 \frac{dx}{x} \xrightarrow{\text{integrando}} \ln |g(x)-1| = 2 \ln |x| + A$$

$$\rightarrow |g(x)-1| = e^A \underbrace{e^{\ln|x|^2}}_{x^2} \rightarrow g(x)-1 = \underbrace{\pm e^A}_C x^2.$$

Con lo cual todas las posibles expresiones (solución general) que se obtienen son $g(x) = 1 + Cx^2$ (donde se sostiene el caso $C=0$ pues $g(x)=1$ es solución de la ecuación diferencial), imponiendo ahora que $g(1)=0$ es necesario que $C = -1$.

Respuesta: $\boxed{g(x) = 1 - x^2}$.