TEMA 1

1. **Calcule** el área del trozo de superficie cónica Σ de ecuación $z^2 = x^2 + y^2$ con $x^2 + y^2 \leq 2y$, $z \geq 0$.

Dado que los puntos de la superficie cumplen con $z \geq 0$, Σ admite la parametrización $\vec{X} = (x, y, \sqrt{x^2 + y^2})$ con $(x, y) \in D$, donde D cumple $\vec{F}(x, y)$

con $x^2 + y^2 \leq 2y$ o bien $x^2 + (y-1)^2 \leq 1$ que es un círculo de radio 1 con centro en $(0,1)$, rayado en rojo. Siendo $\text{área}(\Sigma) = \iint_D \|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\| dx dy$.

Dado que $(\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y)(x, y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & x/\sqrt{x^2 + y^2} \\ 0 & 1 & y/\sqrt{x^2 + y^2} \end{vmatrix} = (-x/\sqrt{x^2 + y^2}, -y/\sqrt{x^2 + y^2}, 1)$, resulta:

$$\|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\|(x, y) = [x^2/(x^2 + y^2) + y^2/(x^2 + y^2) + 1]^{1/2} = \sqrt{2}.$$

Entonces, $\text{área}(\Sigma) = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \text{área}(D) = \sqrt{2} \pi 1^2 \rightarrow \boxed{\text{área}(\Sigma) = \sqrt{2} \pi}$.

2. **Calcule** el volumen del cuerpo D definido por: $z \leq 9 - x^2 - (y-3)^2$, $z \geq 2y$.

Como se observa en la figura, la proyección de D sobre el plano xy es la región D_{xy} rayada en color rojo. La curva C es:

$$C = \begin{cases} z = 9 - x^2 - (y-3)^2 \\ z = 2y \end{cases} \equiv \begin{cases} 2y = 9 - x^2 - (y-3)^2 \\ z = 2y \end{cases} \equiv \begin{cases} x^2 + y^2 - 4y = 0 \\ z = 2y \end{cases}$$

Con lo cual $x^2 + y^2 - 4y = 0$ es la ecuación de la proyección de C sobre el plano xy , es decir, es el borde de D_{xy} .

Completando cuadrados es $x^2 + (y-2)^2 = 4$, entonces:

$$\text{Vol}(D) = \iiint_D dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{2y}^{9-x^2-(y-3)^2} dz = \iint_{D_{xy}} [4y - x^2 - y^2] dx dy.$$

Aplicando el cambio de variables $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = 2 + r \sin(\theta) \end{cases}$ con $|J(r, \theta)| = r$, resulta:

$$\text{Vol}(D) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \underbrace{(4 - r^2)}_{[2r^2 - \frac{1}{4}r^4]_0^2} r dr = 4 \int_0^{2\pi} d\theta = 8\pi. \quad \boxed{\text{Vol}(D) = 8\pi}$$

3. Sea $\phi(x, y, z) = 3 + e^{z+x^2+y^2-7}$ la función potencial de $\vec{f}$ en $\mathbb{R}^3$ y sea Σ el trozo de superficie de potencial 4 del campo cuyos puntos cumplen con $z \geq 3$. **Calcule** el flujo de $\vec{f}$ a través de Σ orientada hacia z^+ .

La ecuación de Σ es $3 + e^{z+x^2+y^2-7} = 4 \Leftrightarrow z + x^2 + y^2 - 7 = 0$, es decir, $z = 7 - x^2 - y^2$ con $z \geq 3$. Observando el gráfico surge que:

$$C = \begin{cases} z = 7 - x^2 - y^2 \\ z = 3 \end{cases} \equiv \begin{cases} 3 = 7 - x^2 - y^2 \\ z = 3 \end{cases} \equiv \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

Con lo cual Σ admite la parametrización:

$$\vec{X} = \underbrace{(x, y, 7 - x^2 - y^2)}_{\vec{F}(x,y)} \text{ con } (x, y) \in D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Un vector normal a Σ es $\vec{n}(x, y) = (\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y)(x, y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2x \\ 0 & 1 & -2y \end{vmatrix} = (2x, 2y, 1)$, que está orientado –

como se pide– hacia z^+ (su tercera componente es positiva). Entonces:

$$\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iint_{D_{xy}} \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \frac{\vec{n}(x, y)}{\|\vec{n}(x, y)\|} \|\vec{n}(x, y)\| dx dy \quad (*)$$

Dado que $\vec{f}(x, y, z) = \nabla \phi(x, y, z) = (2xe^{z+x^2+y^2-7}, 2ye^{z+x^2+y^2-7}, e^{z+x^2+y^2-7})$,

$$\vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \vec{n}(x, y) = (2x, 2y, 1) \cdot (2x, 2y, 1) = 4x^2 + 4y^2 + 1.$$

Reemplazando en (*) resulta $\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iint_{D_{xy}} (4x^2 + 4y^2 + 1) dx dy$, y pasando a coordenadas po-

lares: $\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4r^2 + 1)r dr = 18 \int_0^{2\pi} d\theta = 36\pi \rightarrow \boxed{\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = 36\pi}$.

4. Sea F la familia de curvas planas de ecuación $y = Cx^2$. **Calcule** el área de la región H limitada por la curva de la familia ortogonal a F que contiene al punto $(2, 2)$, con $x \geq 0$.

Siendo $\begin{cases} y = Cx^2 \\ y' = 2Cx \end{cases} \xrightarrow{\text{eliminando } C} y = \frac{1}{2} y' x$, que es la ecuación diferencial de la familia F .

Reemplazando en esta última y' por $-1/y'$ resulta $y = \frac{-1}{2y'} x$, o bien $2yy' = -x$ que es la ecuación diferencial de la familia $F_{\perp}$, ortogonal a F .

Siendo $2yy' = -x \rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = -x \rightarrow 2y dy = -x dx \rightarrow \int 2y dy = -\int x dx \rightarrow y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + K$.

Así, la ecuación de $F_{\perp}$ es: $\frac{1}{2}x^2 + y^2 = K$. La curva de esta familia que contiene al punto $(2, 2)$ debe cumplir con $2 + 4 = K$.

De donde, la curva buscada tiene ecuación $\frac{1}{2}x^2 + y^2 = 6$, llevándola a

la forma canónica resulta $\frac{x^2}{(\sqrt{12})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{6})^2} = 1$.

Entonces la región H , para $x \geq 0$, está limitada por esta elipse de semiejes $a = \sqrt{12}$ y $b = \sqrt{6}$. Para calcular el área se puede aplicar el cambio de variables:

$$\begin{cases} x = \sqrt{12} r \cos(\theta) \\ y = \sqrt{6} r \sin(\theta) \end{cases} \text{ con } |J(r, \theta)| = \sqrt{12} \sqrt{6} r = 6\sqrt{2} r.$$

$$\text{área}(H) = \iint_H dx dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \underbrace{6\sqrt{2} r}_{3\sqrt{2}[r^2]_0^1} dr = 3\sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta = 3\sqrt{2} \pi \rightarrow \boxed{\text{área}(H) = 3\sqrt{2} \pi}.$$

5. La superficie Σ de ecuación $z = x^2 - 4x + x^2 + 3$ tiene tres puntos (A, B y C) donde el plano tangente es paralelo al plano xy . Dado $\vec{f}(x, y, z) = (xy + z^2, x^2 + h(y), h(x))$ con $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, calcule la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva borde del triángulo cuyos vértices son los puntos mencionados. La circulación debe realizarse en el sentido $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, indicando cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos a los que se decidió denominar A, B y C .

Denotando $g(x, y) = x^2 - 4x + x^2 + 3$, siendo g diferenciable por ser polinómica, los puntos de Σ con plano tangente paralelo al plano xy son del tipo $(x_0, y_0, g(x_0, y_0))$ para los cuales $\nabla g(x_0, y_0) = \vec{0}$.

$$\begin{cases} g'_x(x, y) = 2x - 4 + y^2 \\ g'_y(x, y) = 2xy \end{cases} \cdot \begin{cases} 2x - 4 + y^2 = 0 \quad (*) \\ 2xy = 0 \end{cases} \rightarrow x = 0 \vee y = 0$$

$$x = 0 \xrightarrow{(*)} -4 + y^2 = 0 \rightarrow y = -2 \vee y = 2 \rightarrow (0, -2) \text{ y } (0, 2)$$

$$y = 0 \xrightarrow{(*)} 2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0)$$

Así, los puntos buscados son $A = (0, 2, 3)$, $B = (0, -2, 3)$ y $C = (2, 0, -1)$, representados en el esquema.

Dado que $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ pero no se conoce la expresión de h , intentaremos calcular la circulación pedida aplicando el teorema del rotor, usando como superficie S la del triángulo que tiene como vértices a dichos puntos. Del esquema anterior surge directamente que la proyección de S sobre el plano xy es la región D dibujada a la derecha.

Con lo cual conviene parametrizar S en función de x e y .

Un vector normal al plano es $\vec{N} = (B - A) \times (C - A) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -4 & 0 \\ 2 & -2 & -4 \end{vmatrix} = (16, 0, 8)$. Con lo cual, una ecuación cartesiana para el mismo es $((x, y, z) - (0, 2, 3)) \cdot (16, 0, 8) = 0$. Es decir, $z = 3 - 2x$, de donde S admite la parametrización $\vec{X} = \underbrace{(x, y, 3 - 2x)}_{\vec{F}(x, y)}$ con $(x, y) \in D$.

Siendo que $\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (2, 0, 1)$, se obtiene de la parametrización y es normal al plano con la orientación buscada (hacia z^+), usamos como vector normal $\vec{n} = (2, 0, 1)$.

Denotando con Γ^+ la orientación representada en el esquema (para el borde del triángulo):

$$\oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_S \nabla \times \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iint_D \nabla \times \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \|\vec{n}\| dx dy \quad (*)$$

Como $\nabla \times \vec{f}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ xy + z^2 & x^2 + h(y) & h(x) \end{vmatrix} = (0, 2z - h'(x), x) \Rightarrow \nabla \times \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \vec{n} = x$,

reemplazando en (*) resulta: $\oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_D x dx dy = \int_0^2 x dx \int_{x-2}^{2-x} dy = \int_0^2 x(4 - 2x) dx = [2x^2 - \frac{2}{3}x^3]_0^2 = 8/3$. **Respuesta:** $\boxed{\oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 8/3}$.

Nota: Para el cálculo del flujo se usó el vector $\vec{n} = (2, 0, 1)$ obtenido desde la parametrización de S . Es incorrecto aplicar el mismo procedimiento usando $\vec{N} = (16, 0, 8)$, aunque ambos tienen la misma orientación y son normales a la superficie.

TEMA 2

1. **Calcule** el área del trozo de superficie cónica Σ de ecuación $z^2 = x^2 + y^2$ con $x^2 + y^2 \leq 2x$, $z \geq 0$.

Dado que los puntos de la superficie cumplen con $z \geq 0$, Σ admite la parametrización $\vec{X} = (x, y, \sqrt{x^2 + y^2})$ con $(x, y) \in D$, donde D cumple $\vec{F}(x, y)$

con $x^2 + y^2 \leq 2x$ o bien $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ que es un círculo de radio 1 con centro en $(1,0)$, rayado en rojo. Siendo $\text{área}(\Sigma) = \iint_D \|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\| dx dy$.

Dado que $(\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y)(x, y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & x/\sqrt{x^2 + y^2} \\ 0 & 1 & y/\sqrt{x^2 + y^2} \end{vmatrix} = (-x/\sqrt{x^2 + y^2}, -y/\sqrt{x^2 + y^2}, 1)$, resulta:

$$\|\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y\|(x, y) = [x^2/(x^2 + y^2) + y^2/(x^2 + y^2) + 1]^{1/2} = \sqrt{2}.$$

Entonces, $\text{área}(\Sigma) = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \text{área}(D) = \sqrt{2} \pi 1^2 \rightarrow \boxed{\text{área}(\Sigma) = \sqrt{2} \pi}$.

2. **Calcule** el volumen del cuerpo D definido por: $z \leq 9 - (x-3)^2 - y^2$, $z \geq 2x$.

Como se observa en la figura, la proyección de D sobre el plano xy es la región D_{xy} rayada en color rojo. La curva C , intersección del paraboloide con el plano, es:

$$C = \begin{cases} z = 9 - (x-3)^2 - y^2 \\ z = 2x \end{cases} \equiv \begin{cases} 2x = 9 - (x-3)^2 - y^2 \\ z = 2x \end{cases} \equiv \begin{cases} x^2 + y^2 - 4x = 0 \\ z = 2x \end{cases}$$

Con lo cual $x^2 + y^2 - 4x = 0$ es la ecuación de la proyección de C sobre el plano xy , es decir, es el borde de D_{xy} .

Completando cuadrados es $(x-2)^2 + y^2 = 4$, entonces:

$$\text{Vol}(D) = \iiint_D dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{2x}^{9 - (x-2)^2 - y^2} dz = \iint_{D_{xy}} [4x - x^2 - y^2] dx dy.$$

Aplicando el cambio de variables $\begin{cases} x = 2 + r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$ con $|J(r, \theta)| = r$, resulta:

$$\text{Vol}(D) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \underbrace{(4 - r^2)r}_{[2r^2 - \frac{1}{4}r^4]_0^2} dr = 4 \int_0^{2\pi} d\theta = 8\pi. \quad \boxed{\text{Vol}(D) = 8\pi}$$

3. Sea $\phi(x, y, z) = 5 + e^{z+x^2+y^2-10}$ la función potencial de $\vec{f}$ en $\mathbb{R}^3$ y sea Σ el trozo de superficie de potencial 6 del campo cuyos puntos cumplen con $z \geq 6$. **Calcule** el flujo de $\vec{f}$ a través de Σ orientada hacia z^+ .

La ecuación de Σ es $5 + e^{z+x^2+y^2-10} = 6 \Leftrightarrow z + x^2 + y^2 - 10 = 0$, es decir, $z = 10 - x^2 - y^2$ con $z \geq 6$. Observando el gráfico surge que:

$$C = \begin{cases} z = 10 - x^2 - y^2 \\ z = 6 \end{cases} \equiv \begin{cases} 6 = 10 - x^2 - y^2 \\ z = 6 \end{cases} \equiv \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 6 \end{cases}$$

Con lo cual Σ admite la parametrización:

$$\vec{X} = \underbrace{(x, y, 10 - x^2 - y^2)}_{\vec{F}(x,y)} \text{ con } (x, y) \in D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Un vector normal a Σ es $\vec{n}(x, y) = (\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y)(x, y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2x \\ 0 & 1 & -2y \end{vmatrix} = (2x, 2y, 1)$, que está orientado –

como se pide– hacia z^+ (su tercera componente es positiva). Entonces:

$$\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iint_{D_{xy}} \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \frac{\vec{n}(x, y)}{\|\vec{n}(x, y)\|} \|\vec{n}(x, y)\| \, dx \, dy \quad (*)$$

Dado que $\vec{f}(x, y, z) = \nabla \phi(x, y, z) = (2xe^{z+x^2+y^2-10}, 2ye^{z+x^2+y^2-10}, e^{z+x^2+y^2-10})$,

$$\vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \vec{n}(x, y) = (2x, 2y, 1) \cdot (2x, 2y, 1) = 4x^2 + 4y^2 + 1.$$

Reemplazando en (*) resulta $\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iint_{D_{xy}} (4x^2 + 4y^2 + 1) \, dx \, dy$, y pasando a coordenadas po-

$$\text{lares: } \iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \underbrace{\int_0^2 (4r^2 + 1)r \, dr}_{[r^4 + r^2/2]_0^2} = 18 \int_0^{2\pi} d\theta = 36\pi \rightarrow \boxed{\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = 36\pi}.$$

4. Sea F la familia de curvas planas de ecuación $y = Cx^4$. **Calcule** el área de la región limitada por la curva de la familia ortogonal a F que contiene al punto $(2, 1)$, con $x \geq 0$.

Siendo $\begin{cases} y = Cx^4 \\ y' = 4Cx^3 \end{cases} \xrightarrow{\text{eliminando } C} y = \frac{1}{4}y'x$, que es la ecuación diferencial de la familia F .

Reemplazando en esta última y' por $-1/y'$ resulta $y = \frac{-1}{4y'}x$, o bien $4yy' = -x$ que es la ecuación diferencial de la familia $F_{\perp}$, ortogonal a F .

Siendo $4yy' = -x \rightarrow 4y \frac{dy}{dx} = -x \rightarrow 4y \, dy = -x \, dx \rightarrow \int 4y \, dy = -\int x \, dx \rightarrow 2y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + K$.

Así, la ecuación de $F_{\perp}$ es: $\frac{1}{2}x^2 + 2y^2 = K$. La curva de esta familia que contiene al punto $(2, 1)$ debe cumplir con $2 + 2 = K$.

De donde, la curva buscada tiene ecuación $\frac{1}{2}x^2 + 2y^2 = 4$, llevándola a

la forma canónica resulta $\frac{x^2}{(\sqrt{8})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$.

Entonces la región H , para $x \geq 0$, está limitada por esta elipse de semi-ejes $a = \sqrt{8}$ y $b = \sqrt{2}$. Para calcular el área se puede aplicar el cambio de variables:

$$\begin{cases} x = \sqrt{8} r \cos(\theta) \\ y = \sqrt{2} r \sin(\theta) \end{cases} \text{ con } |J(r, \theta)| = \sqrt{8} \sqrt{2} r = 4r.$$

$$\text{área}(H) = \iint_H dx \, dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \underbrace{\int_0^1 4r \, dr}_{2[r^2]_0^1} = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta = 2\pi \rightarrow \boxed{\text{área}(H) = 2\pi}.$$

5. La superficie Σ de ecuación $z = y^2 - 4y + x^2 y + 3$ tiene tres puntos (A, B y C) donde el plano tangente es paralelo a plano xy . Dado $\vec{f}(x, y, z) = (y^2 + h(x), 3xy + z^2, h(y))$ con $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, **calcule** la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva borde del triángulo cuyos vértices son los puntos mencionados. La circulación debe realizarse en el sentido $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, indicando cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos a los que se decidió denominar A, B y C .

Denotando $g(x, y) = y^2 - 4y + x^2 y + 3$, siendo g diferenciable por ser polinómica, los puntos de Σ con plano tangente paralelo al plano xy son del tipo $(x_0, y_0, g(x_0, y_0))$ para los cuales $\nabla g(x_0, y_0) = \vec{0}$.

$$\begin{cases} g'_x(x, y) = 2xy \\ g'_y(x, y) = 2y - 4 + x^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2xy = 0 \\ 2y - 4 + x^2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \vee y = 0 \\ (*) \end{cases}$$

$$x = 0 \xrightarrow{(*)} 2y - 4 = 0 \rightarrow y = 2 \rightarrow (0, 2)$$

$$y = 0 \xrightarrow{(*)} -4 + x^2 = 0 \rightarrow x = -2 \vee x = 2 \rightarrow (-2, 0) \text{ y } (2, 0)$$

Así, los puntos buscados son $A = (2, 0, 3)$, $B = (0, 2, -1)$ y $C = (-2, 0, 3)$, representados en el esquema.

Dado que $\vec{f} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ pero no se conoce la expresión de h , intentaremos calcular la circulación pedida aplicando el teorema del rotor, usando como superficie S la del triángulo que tiene como vértices a dichos puntos. Del esquema anterior surge directamente que la proyección de S sobre el plano xy es la región D dibujada a la derecha.

Con lo cual conviene parametrizar S en función de x e y .

Un vector normal al plano es $\vec{N} = (B - A) \times (C - A) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 2 & -4 \\ -4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 16, 8)$. Con lo cual, una ecuación cartesiana para el mismo es $((x, y, z) - (2, 0, 3)) \cdot (0, 16, 8) = 0$. Es decir, $z = 3 - 2y$, de donde S admite la parametrización $\vec{X} = \underbrace{(x, y, 3 - 2y)}_{\vec{F}(x, y)}$ con $(x, y) \in D$.

Siendo que $\vec{F}'_x \times \vec{F}'_y = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (0, 2, 1)$ se obtiene de la parametrización y es normal al plano con

la orientación buscada (hacia z^+), usamos como vector normal $\vec{n} = (0, 2, 1)$.

Denotando con Γ^+ la orientación representada en el esquema (para el borde del triángulo):

$$\oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_S \nabla \times \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iint_D \nabla \times \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \|\vec{n}\| dx dy \quad (*)$$

Como $\nabla \times \vec{f}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ y^2 + h(x) & 3xy + z^2 & h(y) \end{vmatrix} = (h'(y) - 2z, 0, y) \Rightarrow \nabla \times \vec{f}(\vec{F}(x, y)) \cdot \vec{n} = y$,

$$\begin{aligned} \text{reemplazando en } (*) \text{ resulta: } \oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} &= \iint_D y dx dy = \int_0^2 y dy \int_{y-2}^{2-y} dx = \int_0^2 y(4 - 2y) dx = \\ &= [2y^2 - \frac{2}{3}y^3]_0^2 = 8/3. \text{ Respuesta: } \boxed{\oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 8/3}. \end{aligned}$$

Nota: Para el cálculo del flujo se usó el vector $\vec{n} = (0, 2, 1)$ obtenido desde la parametrización de S . Es incorrecto aplicar el mismo procedimiento usando $\vec{N} = (0, 16, 8)$, aunque ambos tienen la misma orientación y son normales a la superficie.