

<u>TRABAJO PRACTICO N° 06:</u> <u>“ESTADO DE TENSIÓN - ET”</u>

EJERCICIOS OBLIGATORIOS:

- Ejercicio N°02
- Ejercicio N°03
- Ejercicio N°06

EJERCICIOS N° 01: Para el estado de tensión de un punto dado de un cuerpo, se pide:




- 01.01 – Clasificar el estado de tensión mediante la determinación de los invariantes e interpretar el resultado;
- 01.02 – Determinar vectorialmente y en módulo los siguientes vectores: ρ_α , σ_α y τ_α para un plano pasante por el punto, cuya normal n , forma ángulos α' y β' con los ejes coordenados x e y respectivamente;
- 01.03 - Determinar las tensiones principales;
- 01.04 - Determinar las direcciones principales 1, 2 y 3 calculando los cosenos directores de los planos principales;
- 01.05 - Verificar con el tensor principal hallado, los valores de σ y τ , asociados al plano “X”;
- 01.06 - Calcular ρ , σ y τ en un plano cuya normal forma ángulos α y β con los ejes 1 y 2 respectivamente;
- 01.07 - Calcular los ángulos que forma ρ con los ejes principales;
- 01.08 – Descomponer los dos tensores de tensiones calculados, el correspondiente a la terna (O;X;Y;Z) y el determinado en base a la terna principal, en los tensores esférico y desviador.

DATOS:

$\tau_{xy} = \sigma_x =$	80 (MN/m ²)	$\alpha' =$	30°
$\tau_{zx} = \sigma_z =$	40 (MN/m ²)	$\beta' =$	80°
$\sigma_y =$	-10 (MN/m ²)	$\alpha =$	40°
$\tau_{yz} =$	80 (MN/m ²)	$\beta =$	70°


EJERCICIO N° 02: Para cada uno de los estados de tensión mostrados a través de cubos elementales, se pide:

- 02.01 - Dibujar los cubos elementales en los puntos indicados con el estado de tensión asociado, indicando claramente las tensiones generadas con dirección y sentido;
- 02.02 - Escribir el tensor de tensiones;
- 02.03 - Calcular los invariantes;
- 02.04 - Clasificar el estado de tensión en función de los invariantes y mediante la obtención del tensor principal;
- 02.05 - Calcular las tensiones y las direcciones principales, y representarlas a través de un esquema 3D;
- 02.06 - Representar todo lo calculado precedentemente por medio de las Circunferencias de Mohr, indicando todos los elementos característicos (polos, trazas, tensiones actuantes en terna – (0;X;Y;Z) – y tensiones principales);

EJERCICIO N° 02 - FIGURA N° 02:		
EJERCICIO N° 02.01:  FIG. N° 02.01 IPN sometido a momento flector y corte. En el punto P, las tensiones generadas por cada esfuerzo son las indicadas a continuación. $Tensión_{Mf} = Tensión_{Vf} = 50.0 \text{ MN/m}^2$	EJERCICIO N° 02.02:  FIG. N° 02.02 Sección rectangular hueca sometida a corte. En el punto P, las tensiones generadas por el corte es la indicada a continuación. $Tensión_{Qc} = 50.0 \text{ kN/m}^2$	EJERCICIO N° 02.03:  FIG. N° 02.03 Barra de sección cuadrada apoyada sobre muros infinitamente rígidos sometida a P1 y P2. Despreciar rozamiento. $P_1 = P_2 = 50.0 \text{ MN/m}^2$

EJERCICIO N° 03: Para cada uno de los cubos elementales de la figura N° 03, se pide:

- 03.01 – Determinar el tensor de tensiones correspondiente a cada cubo elemental indicado;
- 03.02 – Clasificar el estado de tensión;
- 03.03 – Determinar las tensiones principales;
- 03.04 – Determinar los cosenos directores de las direcciones principales referidos a la terna de las figuras;
- 03.05 – Calcular las tensiones tangenciales máximas en función de las tensiones principales;
- 03.06 – Representar todo lo calculado precedentemente por medio de las Circunferencias de Mohr, indicando todos los elementos característicos (polos, trazas, tensiones actuantes en terna – (0;X;Y;Z) – y tensiones principales);
- 03.07 – Calcular las tensiones asociadas al plano sombreado de cada cubo elemental



EJERCICIO N° 04: En un punto de un sólido se sabe que Z es una dirección principal siendo $\sigma_z = 0$, la correspondiente tensión principal. Conociendo σ_x , σ_y , τ_{xy} se pide determinar:

- 04.01 - Las otras dos tensiones principales y direcciones principales;
- 04.02 - El vector tensión ρ y sus componentes σ y τ en un plano de eje sostén Z, y cuya normal forme un ángulo $\alpha'_n = 30^\circ$ con el eje X (tomado de X a Y);
- 04.03 - La tensión tangencial máxima, en los infinitos planos pasantes por el punto y las direcciones de las normales a los planos en que actúan (y las tensiones normales respectivas asociadas a ellos).

DATOS: $\sigma_x = \text{IDEM EJ N° 01}$ $\sigma_y = \text{IDEM EJ N° 01}$ $\tau_{xy} = \sigma_x / 2$

EJERCICIO N° 05: Para cada uno de los estados tensionales que se indican por medio de la siguiente tabla de datos, se pide:

- 05.01 – Para los ítems 05.01 y 05.02, dibujar los cubos elementales en los puntos indicados con el estado de tensión asociado, indicando claramente las tensiones generadas con dirección y sentido;
- 05.02 – Determinar el tensor de tensiones correspondiente a cada estado;
- 05.03 – Dibujar el cubo elemental mostrando las tensiones actuantes;
- 05.04 – Clasificar el estado de tensión;
- 05.05 – Determinar las tensiones principales;
- 05.06 – Determinar los cosenos directores de las direcciones principales referidos a la terna de las figuras;
- 05.07 – Calcular las tensiones, ρ_π , σ_π y τ_π , asociadas al plano que se indica a través de los cosenos directores de su normal


VARIABLE	EJ. N° 05.01	EJ. N° 05.02	EJ. N° 05.03
σ_x	50	$\epsilon?$	0
σ_y	50	$\epsilon?$	80
σ_z	50	$\epsilon?$	80
τ_{xy}	0	$\epsilon?$	0
τ_{xz}	0	$\epsilon?$	0
τ_{yz}	0	$\epsilon?$	80
α	80°	$\epsilon?$	90°
β	35°	90°	45°
γ	$\epsilon?$	28°	$\epsilon?$

Las unidades de las tensiones están expresadas en “MPa”.

EJ. N°05.02: El Titanic se encuentra a aproximadamente 4000 metros de profundidad en algún punto del océano atlántico entre el Reino Unido y Estados Unidos. Suponiendo que tiene un largo de 269 metros y una altura de 53 metros, ¿cuál será la mayor diferencia de tensión entre 2 puntos pertenecientes a su estructura? ¿Por qué sería correcto afirmar que todos los puntos se encuentran sometidos al mismo estado tensional? Resolver este punto para ese estado de tensiones.

EJERCICIO N° 06: La tensión en un punto interior de un cuerpo es la suma de los dos estados representados en las siguientes figuras. Se requiere que se determine para cada caso:

- 06.01 - El estado de tensión resultante (tensor de tensiones total) expresado en la terna que se indica en cada caso;
- 06.02 - Las tensiones principales del estado resultante de tensiones;
- 06.03 - Las direcciones principales del estado resultante de tensiones.






UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 06.02 - FIGURA N° 06.02:



TERNA (O;1;2;3)



TERNA (O;U;V;W)

DATOS: $|\sigma_1| = |\sigma_2| = |\tau_{UV}|$

El estado de tensión resultante deberá expresarse en la terna (O; X; Y; Z); así como todas las determinaciones requeridas.

EJERCICIOS N° 07: Para el estado de tensión de un punto dado de un cuerpo, se pide determinar y calcular:

- 07.01 – Escribir el tensor de tensiones y representarlo gráficamente mediante un cubo elemental de tensiones;
- 07.02 – Clasificar el estado de tensión;
- 07.03 - Determinar las tensiones principales;
- 07.04 - Determinar las direcciones principales 1, 2 y 3 calculando los cosenos directores de los planos principales;
- 07.05 - Calcular ρ , σ y τ para un plano π cuya normal forma ángulos $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$ y $\gamma = 90^\circ$ con los ejes X, Y y Z respectivamente;
- 07.06 – Realizar la representación del estado tensional mediante la construcción de Mohr considerando al mismo como un estado plano.
- 07.07 – Determinar con ambas construcciones las tensiones correspondientes al plano π del punto 07.05;
- 07.08 – Verificar analíticamente los valores obtenidos para el plano π del punto 07.05, pero referido a la terna principal;
- 07.09 – Descomponer el tensor de tensiones en un tensor esférico y en uno desviador;
- 07.10 – Calcular las tensiones octaédricas y representarlas gráficamente.

Nota: La normal del plano octaédrico forma el mismo ángulo con las tres direcciones principales ($1/\sqrt{3}$, $1/\sqrt{3}$, $1/\sqrt{3}$)

DATOS:

$\sigma_X =$	-60 (MN/m ²)	$\sigma_Y =$	60 (MN/m ²)
$\tau_{XY} =$	-40 (MN/m ²)	$\tau_{YX} =$	-40 (MN/m ²)
$\sigma_Z =$	0 (MN/m ²)	$\tau_{XZ} = \tau_{ZX} =$	0 (MN/m ²)

05.06-ET	TP N° 06: Estado de Tensión - ET	0	2023	2	Todos	Pág.: 6
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 7

	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD	
ESTABILIDAD II – 84.03		

EJERCICIOS N° 08: Demostrar teóricamente las siguientes consignas:

08.01 - Demostrar que si $\sigma_1 \neq \sigma_2 = \sigma_3$; las tensiones correspondientes a planos normales al plano en que actúa σ_1 , resultan iguales entre sí e iguales a $\sigma_2 = \sigma_3$.

08.02 - Demostrar que si $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$; las tensiones en los infinitos planos que pasan por el punto son iguales entre sí e iguales a las tensiones principales.

08.03 - Demostrar que si $\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$; en los infinitos planos restantes existen tensiones tangenciales.

08.04 - Para un estado hidrostático de tensiones se pide representarlo a través de las circunferencias de Mohr, indicando las ubicaciones de los centros de las circunferencias fundamentales de Mohr, sus radios y sus extremos, y las tensiones tangenciales máximas y mínimas.

08.05 - Ídem "08.04" pero para un estado de tensión de equitracción.

05.06-ET	TP N° 06: Estado de Tensión - ET	0	2023	2	Todos	Pág.: 7
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 7